


## **Chirurgie de reconstruction du périnée en Afrique Sub-Saharienne: enseignement et compagnonnage au service des femmes**

*E. Liot\*, G. Meurette\*, F. Ris\*, L. Dumont\*\**

*Service de chirurgie viscérale\* et d'Anesthésiologie\*\* des Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse*

Fresque murale, hôpital de Dar-Es-Salam




Un accouchement peut entraîner des **lésions périnéales** responsables d'écoulements, de fistules recto-vaginales voire d'incontinence fécale.

Les **jeunes femmes** d'Afrique Sub-Saharienne souffrant de ces pathologies sont fréquemment **rejetées** par leur conjoint et leur famille.

Elles peuvent faire l'objet de **discrimination** et se retrouver forcées de vivre en marge de la société.

Pour répondre à cette **grande détresse physique et psychologique**, la connaissance des facteurs de risque de survenue des lésions, la capacité à les diagnostiquer et l'expertise dans leur traitement sont primordiales.



Fresque murale, hôpital de Dar-Es-Salam

La **coopération** entre l'association humanitaire **2<sup>nd</sup> Chance** et des **hôpitaux d'Afrique Sub-Saharienne** a pour objectif de **former des chirurgiens locaux**, gynécologues et chirurgiens généraux, à la prise en charge des lésions post-obstétricales du périnée.



Niveau 3 du programme de formation



Niveau 1 du programme de formation

Niveau 2 du programme de formation



La formation est organisée en **3 niveaux de qualification** correspondant chacun à un module composé d'un enseignement théorique, d'interventions pratiquées sous supervision d'experts et de temps d'échange d'expériences et de conseils.

Après l'obtention du **certificat d'autonomie validant l'acquisition des compétences**, les chirurgiens peuvent devenir à leur tour **instructeurs** lors des formations futures.

Ce **programme basé sur l'enseignement et le compagnonnage** des chirurgiens d'Afrique Sub-Saharienne **renforce les compétences locales et facilite l'accès à des soins de qualité** pour de nombreuses patientes souffrant de lésions périnéales post-obstétricales.

**La reconstruction de leur périnée aide ces femmes à recouvrer leur dignité et leur place dans la société.**